



Případová studie D

Základní informace

Název výzkumné jednotky	A Cell in a Honeycomb
Autor jednotky	Škola Da Vinci School, Dolní Břežany
Vychází z konceptu výukové jednotky	Contrasting nature's economy to overconsumption
Autor konceptu výukové jednotky	Panepistimio Thessalis, Řecko
Datum výuky	29. 11. 2023
Počet žáků ve třídě	8
Počet žáků s OMJ	2

1. Popis výzkumné výukové jednotky

Název	Jaký tvar má mít včelí plástev?
Koncept vyučovací jednotky	Matematické modelování
Věk žáků / ročník	14 - 16
Délka jednotky	90 minut
Matematický obsah	Geometrické obrazce, obsah
Vstupní znalosti	<ul style="list-style-type: none">• Základní geometrické obrazce – trojúhelník, obdélník, kružnice, šestiúhelník• Obsah a obvod těchto útvarů• Pythagorova věta
Potřebné materiály	<ul style="list-style-type: none">• Pracovní list• Obrázky včelí plástve (lze je najít na internetu)
Cíle	<ul style="list-style-type: none">• Opakování geometrických obrazců, jejich obvodu a obsahu• Využití geometrických obrazců• Vztahy mezi geometrií a přírodou
Poznámky k práci se žáky s OMJ	<ul style="list-style-type: none">• Specifickou slovní zásobu z oblasti včel je třeba představit před začátkem výuky této jednotky.

Plán hodiny

1. Úvod – základní fakta o včelích plástvích
2. Skupinová práce s pracovním listem níže
3. Diskuze v celé třídě a porovnání výsledků
4. Krátký film – https://www.youtube.com/watch?v=QEzlsjAqADA&ab_channel=TED-Ed

Jaký tvar má mít buňka ve včelí plástvi?

Buňka ve včelí plástvi musí mít takový tvar, aby

- do ní mohla matka vsunout zadeček a naklást vajíčko na dno,
- se v ní mohla vylíhnout včela,
- se jich na co nejmenší plochu vešlo co nejvíc z důvodu udržení teploty 35 °C potřebné pro vývoj larev
- v ní bylo možné skladovat med a pyl
- se do ní mohla včela-čistička dostat a uklidit ji

Dospělá včela potřebuje prostor o průměru zhruba 5,3 mm. Pro tvar včelí buňky můžeme tedy uvažovat útvary, do kterých lze umístit kruh o průměru právě 5,3 mm. Vybereme některé z nich a porovnáme jejich výhodnost pro uspořádání do plástve. (www.vcelky.cz)

A. Tvar buňky: kruh

1. Načrtněte do rámečku, jak by vypadala plástev s kruhovými buňkami

2. Vypočítejte obsah jedné buňky.



3. Kolik takových buněk by se vešlo do čtverce o obsahu 1 dm²?

4. Jaké výhody / nevýhody má toto uspořádání s kruhovými buňkami?

B. Tvar buňky: rovnostranný trojúhelník

1. Načrtněte do rámečku, jak by vypadala plástev s buňkami tvaru rovnostranného trojúhelníku.

2. Vypočítejte obsah jedné buňky, pokud víme, že poloměr kružnice vepsané můžeme vypočítat podle vzorce $r = \frac{2S}{o}$, kde S je obsah a o je obvod trojúhelníku.



3. Kolik takových buněk by se vešlo do čtverce o obsahu 1 dm²?

4. Jaké výhody / nevýhody má toto uspořádání s trojúhelníkovými buňkami?

C. Tvar buňky: čtverec

1. Načrtněte do rámečku, jak by vypadala pláštěv s buňkami čtvercového tvaru.
2. Vypočítejte obsah jedné buňky.



3. Kolik takových buněk by se vešlo do čtverce o obsahu 1 dm^2 ?
4. Jaké výhody / nevýhody má toto uspořádání se čtvercovými buňkami?

D. Tvar buňky: pravidelný šestiúhelník

1. Načrtněte do rámečku, jak by vypadala pláštěv s buňkami tvaru pravidelného šestiúhelníku.
2. Vypočítejte obsah jedné buňky.



3. Kolik takových buněk by se vešlo do čtverce o obsahu 1 dm^2 ?
4. Jaké výhody / nevýhody má toto uspořádání s šestiúhelníkovými buňkami?

Závěr: Jaký nejvhodnější tvar má buňka ve včelí plástvi a proč?

2. Analýza následného rozhovoru

Hodinu připravil a vedl ředitel školy Da Vinci, které sídlí na okraji Prahy v Dolních Břežanech. Má velmi bohaté zkušenosti s výukou matematiky (matematiku vyučuje už 20 let). Věnuje se také výzkumu v didaktice matematiky. Vyučující v rámci pregraduálního studia neprošel kurzem zaměřeným na práci se žáky s OMJ. Takové školení se neúčastnil ani v posledním roce. Zúčastnil se však konference dalšího vzdělávání učitelů v Praze na Karlově univerzitě pořádané v rámci projektu M4M.

Škola Da Vinci, kde výuka probíhala, je soukromá škola, kde jsou respektovány individuální potřeby každého z žáků.

Vyučující má zkušenosti s výukou žáků s OMJ. Za největší překážky ve výuce těchto žáků považuje vyučovací jazyk, slovní zásobu a motivaci žáků. Přesto vidí, že žáci s OMJ přinášejí do třídy nové impulsy a díky jejich přítomnosti se třída stává vnímavější ke kulturním otázkám a učí se respektovat jiné kultury. Vzhledem k tomu, že při pilotování jednotky ve skupině byli žáci s OMJ, učitel zvýšil počáteční podporu těchto žáků, ujišťoval se, že jsou schopni sledovat, co se v hodině děje postupně se do jednotlivých aktivit zapojovat.

Výuka proběhl ve skupině osmi žáků ve věku 17-18 let. Dva z nich byli žáci s OMJ a byli v České republice déle než rok.

Cílem výuky bylo zopakovat základní geometrické tvary, vypočítat délku a obsah, hledat spojení mezi geometrií a přírodou.

Práce zahrnovala práci ve dvojicích. Jednotka měla u žáků dobrý ohlas. Někteří z nich měli problémy s použitím správných vzorečků v rovnostranném trojúhelníku. Atmosféra v hodině byla velmi dobrá a žáci byli připraveni diskutovat.

Zařazení otevřených úloh umožnilo, aby žáci pracovali svým tempem.

Mezipředmětový charakter aktivity je jejím výhodou, v aktivitě jsou vazby na biologii.

Celkově aktivitu, její průběh a výsledek vyučující hodnotil velmi pozitivně.

3. Doporučení na zlepšení

Vzhledem k tomu, že se někteří žáci potýkali se vzorci, bylo by možná dobré si potřebné vzorečky na začátku zopakovat a vzorečky, které budou potřeba pro další práci případně napsat na tabuli.